Kend forskel på Kæmpe-Bjørneklo og lignende hjemmehørende arter

Der findes planter i den danske natur, som kan forveksles med Kæmpe-Bjørneklo. Disse arter er dog mindre end Kæmpe-Bjørneklo og har anderledes formede blade. En kombination af den meget karakteristiske lugt, bladstilkens rødlige pletter og stive hår, skulle hjælpe mod forveksling. En beskrivelse af de mest almindelige forvekslingsmuligheder ses her. Ingen af de nævnte arter er fredede, men det anbefales, at man undgår at ramme dem, når man bekæmper Kæmpe-Bjørneklo.

Kæmpe-Bjørneklo er giftig og man skal undgå at komme i kontakt med den. Berøring i kombination med sollys kan medføre smertefulde blæner på huden, som er meget længe om at hele. Du kan læse mere om Kæmpe-Bjørneklo og dennes bekæmpelse på Hedensted Kommunes hjemmeside, eller scan QR-koden for mere information.

Nedenstående liste er ikke uudtømmelig, der findes mange skærmplanter i Danmark som kan forveksles, hvoraf nogle er meget giftige. Vær altid sikker på hvilken plante det er, du håndterer.

Karakteristiske forskelle

Kæmpe-Bjørneklo



Ny spiret kæmpe-bjørneklo.



2. års kæmpebjørneklo. Læg mærke til den blanke overside.



Stænglen er hul og håret og med røde pletter.



Store meget takkede blade med glat overside og dunet undersiden.



Meget store skærme med hvide blomster. Kæmpe-bjørneklo bliver op til 4 meter høj.



Kæmpe-bjørnekloen sætter først blomster på dets 2. år eller senere.

Almindelig-Bjørneklo



Bladene er matte på oversiden og hårede på undersiden. De er spinklere med knap så skarpe bladtænder som kæmpe-bjørnekloen.



De hvide blomsters yderblomster er uregelmæssige og har nærmest svale-haler. Dette har kæmpe-bjørneklo ikke.



Stænglen er hul, grøn og håret. Alm. Bjørneklo kan blive op til 2 meter høj.

Strand-Kvan



Delte blade der i en A-form består af mange parallelle småblade med fine takker. Glat over- og underside.



Lysegrøn næsten kugleformet skærm og småskærme.



Stængel hul og glat. Kan være rødlig/purpur anløbende i farven.

Skov-Angelik



Delte glatte blade som består af 2-3 parallelle aflange småblade med ægge-formede savtakkede bladkanter.



Blomsterne er hvide, til tider lyserøde og sidder i en dobbeltskærm.



Stængel er rund, hul og ofte purpurfarvet. Skov-angelik bliver 80-200cm høj.

Forvekslinger i foråret før blomstring

I det tidlige forår inden blomstring kan Kæmpe-Bjørneklo fejlagtigt forveksles med nedenstående arter. Når disse arter blomstrer, træder forskellene mellem dem og Kæmpe-Bjørneklo tydeligere frem, idet blomsterne ser meget anderledes ud.

Kær-Svinemælk



Bladende er aflange, glatte og ikke delt.



Stængel er lysegrøn og hul.



Når kær-svinemælken blomstrer, er meget let at se, at det ikke er en bjørneklo.

Kål-Tidsel



Bladende er svagt tornede, og de øverste blade er ikke delte.



Stængel er lysegrøn og næsten glat, eventuelt med små torne.



Blomsterne sidder ikke i en skærm.

Vild Pastinak



Fjersnitdelte blade med 7-9 parvise grovtakkede småblade og ét endestillet småblad.



Gule blomster i en skærm.



Stængel er lysegrøn med små hår og rødlige streger. Pastinak indeholder samme giftstof som kæmpe-bjørneklo.

Hedensted Kommune